

SAMTYKKESKJEMA

Behandling med botulinumtoksin

GENERELL INFORMASJON

Botulinumtoksin hemmer nerven fra å sende signaler til en muskel for kontraksjon og gir dermed en midlertidig muskelavslapning. Dette legemiddelet brukes for å hindre bevegelsen av muskler som forårsaker rynker i ansiktet, for å behandle hodepine og for å hemme overdreven svette. Det kan også brukes i andre sammenhenger.

Effekten av botulinumtoksin inntreffer etter 2-3 dager, men full effekt sees etter ca 14 dager. Det er derfor først etter to uker man kan vurdere det endelige resultatet. Botulinumtoksin varer mellom 2-6 måneder, i snitt 3 måneder. Hos pasienter med kraftig muskelaktivitet kan behandlingen være mindre effektiv eller vare kortere.

KONTRAINDIKASJON FOR BEHANDLING / FORSIKTIGHETSREGLER VED BEHANDLING

- Det utføres ikke behandling dersom du er gravid eller ammer, dersom du har hatt overfølsomhet for botulinumtoksin tidligere eller dersom du har pågående infeksjon eller hudproblemer i området.
- Pasienter med nervesykdom (ALS, MS, Myasthenia Gravis e.l.) kan ha økt sjanse for bivirkninger og skal ikke behandles. Det er viktig å opplyse om eventuelle sykdommer til din behandlende sykepleier eller lege.
- Pasienter som bruker antibiotika skal opplyse sin behandlende sykepleier eller lege om dette, da interaksjoner kan forekomme.
- Opplys alltid om du bruker legemidler eller har sykdommer/medisinske tilstander.

Navn	Født
Adr	
E-post	Tlf.
<input type="checkbox"/> Kvinne	<input type="checkbox"/> Mann

EVENTUELLE BIVIRKNINGER

Injisering av botulinumtoksin er generelt ansett som en trygg og effektiv behandling, men det er viktig at du som pasient forstår risikoen ved behandlingen og eventuelle bivirkninger den kan ha.

- Det kan forekomme små blødninger fra innstikkstedet som kan forårsake forbigående blåmerker.
- Det kan forekomme forbigående smerte og kløe fra innstikkstedet og infeksjon kan oppstå.
- Det kan forekomme mild og forbigående hodepine i noen dager etter behandling.
- Det kan være at bevegelsen bare hemmes delvis og at gjentatt behandling vil være nødvendig for å oppnå ønsket resultat.
- Ettersom ansiktet normalt er asymmetrisk kan det oppstå en variasjon av effekten mellom de to sidene av ansiktet.
- Botulinumtoksin kan synke nedover fra pannen og gi forbigående svekkelser av musklene som holder øyelokket oppe og du vil få tunge øyelokk (ptose) som en forbigående bivirkning.
- Behandling med botulinumtoksin kan gi tørre øyne og dobbeltsyn.
- I sjeldne tilfeller kan personer danne antistoffer som gjør at effekten av botulinumtoksin blir dårligere.
- Som med alle legemidler finnes det andre mer sjeldne bivirkninger som kan forekomme.

ETTER BEHANDLING

- Unngå å ligge flatt de første 6 timene etter behandling.
- Ikke masser eller gni på det behandlede området de første tre døgnene etter behandling.
- Dersom du får noe som helst problemer etter botulinumtoksinbehandling er det viktig å ta kontakt med behandlingsstedet.
- **Jeg har informert min behandler om eventuelle sykdommer eller legemidler jeg bruker og jeg forstår at det er mitt ansvar å informere om dette.**
- **Jeg er ikke gravid og jeg ammer ikke.**
- **Jeg har fått tilstrekkelig informasjon om behandlingen og forventet effekt.**
- **Jeg har også fått informasjon om kontraindikasjoner og eventuelle bivirkninger.**
- **Jeg er gjort kjent med anbefaling om etterbehandling.**
- **Jeg har fått mulighet til å stille spørsmål om behandlingen.**

Jeg har grundig lest gjennom alle punkter i dette samtykkeskjemaet.

Dato	Underskrift
------	-------------